



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A
JUDEȚULUI CONSTANȚA**

**RECOMANDĂRI SPECIFICE ÎN APARIȚIA CAZURILOR DE HEPATITĂ A
ÎN COLECTIVITATE**

Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța prin Departamentul de Supraveghere în Sănătate Publică - Compartimentul Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile face următoarele recomandări specifice în apariția cazurilor de hepatită A în colectivitate :

1. MĂSURI DE IGIENĂ

- Spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun după folosirea toaletei, înainte de masă și ori de câte ori este nevoie
- Instruirea copiilor privind tehnica de spălare corectă a mâinilor

2. CURĂȚENIE ȘI DEZINFECȚIE RIGUROASE

- efectuarea zilnică a curățeniei și dezinfectiei în spațiile de lucru și în grupurile sanitare, cu asigurarea permanentă a apei potabile, săpunului, hârtiei igienice și hârtiei prosop.
- dezinfecția jucăriilor utilizate în comun în grădinițe
- dezinfecția grupurilor sanitare după fiecare pauză de recreere a copiilor
- utilizarea de produse biocide avizate conform reglementărilor în vigoare, active pe virusul hepatitic A, cu respectarea concentrației și timpului de contact indicate de producător

3. MĂSURI PRIVIND ALIMENTAȚIA

- consum exclusiv de apă potabilă sigură
- spălarea corespunzătoare a fructelor și legumelor înainte de consum
- respectarea strictă a igienei privind prepararea, manipularea și servirea alimentelor



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A
JUDEȚULUI CONSTANȚA**

-personalul care prepară/servește alimentele trebuie să respecte riguros igiena mâinilor și regulile de igienă alimentară

4. TRIAJ EPIDEMIOLOGIC ZILNIC

- supravegherea zilnică a copiilor și personalului-identificarea persoanelor cu simptome sugestive: debut brusc cu febră, stare generală de rău, anorexie, greață, disconfort abdominal, icter și urină hipercromă.
- persoanele simptomatice trebuie retrase din colectivitate și îndrumate către medicul de familie

5. IZOLAREA CAZURILOR

- persoana suspectă/diagnosticată cu HVA trebuie să respecte recomandările medicului privind izolarea și revenirea în colectivitate

6. SUPRAVEGHEREA CONTACTILOR

- identificarea persoanelor care au avut contact apropiat cu cazul
- monitorizarea contactilor pe toată perioada de incubație a bolii (50 de zile)

7. VACCINAREA/ PROFILAXIA POST-EXPUNERE A CONTACTILOR

- contactii trebuie evaluați de medicul de familie în vederea posibilității vaccinării, în funcție de istoricul de boală și vaccinare

8. EDUCAȚIA SANITARĂ

- informarea copiilor privind evitarea folosirii în comun a obiectelor personale (a sticlelor/paharelor de apă, a tacâmurilor) și a alimentelor din care au consumat și alte persoane